

熊本南病院 化学療法レジメン一覧(膵臓・胆道がん)

膵臓がん

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
GEM	ゲムシタビン(ゲムシタビン)	GEM	1000mg/m ²	Day1,8,15	q4w(28日)	軽度
nab-PTX+GEM	アブラキサン((パクリタキセル アルブミン懸濁型))	nab-PTX	125mg/m ²	Day1,8,15	q4w(28日)	中等度
	ゲムシタビン(ゲムシタビン)	GEM	1000mg/m ²	Day1,8,15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	85mg/m ²	Day1	q2w(14日)	高度
	レボホリナート(レボホリナート)	I-LV	200mg/m ²	Day1		
	イリノテカン(イリノテカン)	CPT-11	180mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル)持続	5FU	2400mg/m ²	Day1		

胆道がん

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
GEM	ゲムシタビン(ゲムシタビン)	GEM	1000mg/m ²	Day1,8,15	q4w(28日)	軽度
GEM+S-1	ゲムシタビン(ゲムシタビン)	GEM	1000mg/m ²	Day1,8	q3w(21日)	軽度
	ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	S-1	60~100mg/day	分2 Day1-14		

2021/11/1更新