

熊本南病院 化学療法レジメン一覧(白血病)

急性骨髄性白血病(AML)

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
CAG	アクラシノン(アクラルビシン)	ACR	14mg/m ²	Day1~4	q2w(14日)	軽度
	キロサイド(シタラビン)	Ara-C	10mg/m ² 1日2回S.C	Day1~15		
	フィルグラスチム	G-CSF	100~200 μg/m ²	Day1~14		

ベネトクラクス+シタラビン	ベネトクラクス(ベネクレクスタ)		100mg/body	Day1	q4w(28日)	軽度
			200mg/body	Day2		
			400mg/body	Day3		
			600mg/body	Day4日目以降		
	キロサイド(シタラビン)	Ara-C	20mg/m ²	Day1~10		

☆2クール目以降はベネトクラクスは600mg/bodyを連日内服

ベネトクラクス+アザシチジン	ベネトクラクス(ベネクレクスタ)		100mg/body	Day1	q4w(28日)	中等度
			200mg/body	Day2		
			400mg/body	Day3日目以降		
	ビダーザ(アザシチジン)	AZA	75mg/m ²	Day1~5		

☆2クール目以降はベネトクラクスは400mg/bodyを連日内服

成人T細胞白血病(ATL)

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
モガムリズマブ	ポテリジオ(モガムリズマブ)		1mg/kg	Day1	q1w(7日)	最小度

ヘアリ細胞白血病(HCL)

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
クラドリビン	ロイスタチン(クラドリビン)	2-CdA	0.09mg/kg	Day1~7	q4w(28日)	最小度

2021/11/1更新